

Impfkalender für Kinder, Jugendliche & Erwachsene

Im Impfkalender ist aufgeführt, welche Standardimpfungen 2020 empfohlen werden.

Impfung	Alter in Jahren							
	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Tetanus (Wundstarrkrampf)	N	A1	N	A2		N	A ^{a)}	
Diphtherie	N	A1	N	A2		N	A ^{a)}	
Keuchhusten (Pertussis)	N	A1	N	A2		N	A3 ^{a)}	
<i>Haemophilus influenzae</i> Typ b	N	–						
Poliomyelitis	N		A1		N			
Hepatitis B				N			–	
Pneumokokken							S ^{b)}	
Meningokokken C				N			–	
Masern				N			S ^{c)}	–
Mumps, Röteln				N			–	
Windpocken (Varizellen)				N			–	
humane Papillomaviren (HPV)	–		G1/G2 ^{d)}		N		–	
Herpes zoster (Gürtelrose)							G ^{e)}	
Influenza (saisonale Grippe)							S ^{f)}	

Erläuterungen

Buchstabe	Info
G	Grundimmunisierung
N	Nachholimpfung möglich (Die Impfung sollte nachgeholt werden, wenn die Grundimmunisierung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist)
A	Auffrischimpfung
S	Standardimpfung
a)	Auffrischung jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis. Die nächste fällige Impfung gegen Tetanus und Diphtherie (Td-Impfung) erfolgt einmalig als Impfung gegen Tetanus, Diphtherie und Pertussis (Tdap) bzw. wenn nötig zusätzlich gegen Polio (Tdap-IPV-Kombinationsimpfung)
b)	Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
c)	Einmalige Impfung mit einem Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR-Impfstoff). für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder nur mit einer Impfung in der Kindheit
d)	Impfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 mit 2 Dosen im Abstand von mindestens 5 Monaten. Bei Nachholimpfung, Vervollständigung der Impfserie ab 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von weniger als 5 Monaten zwischen den beiden Dosen ist eine dritte Dosis erforderlich.
e)	Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
f)	Jährliche Impfung



Eigene Notizen
